DLP 27-10-88040049

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

®

Avertissements agricoles

EDITION
BAS-VIVARAIS

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES

Tél. : 78.63.25.65
165, rue Garibaldi - Bât. B- B.P. 3202 - 69401 LYON CEDEX 03

ABONNEMENT ANNUEL : 130 F
RÉGISSEUR RECETTES D.R.A.F.

25 Octobre 1988 N° de série continue 185 Bulletin n° 25

ARBRES FRUITIERS

ARBRES FRUITIERS A NOYAUX :
Bactérioses : poursuivez la lutte
Corynéum, Fusicoccum : protégez les vergers atteints
ARBRES FRUITIERS A PEPINS :
Tavelures : réduisez l'inoculum dans les vergers infestés
Chancre à Nectria : en verger atteint, lutte chimique avec du cuivre
Psylle du poirier : traitement d'automne des vergers entre le 7 et 10 Novembre

ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

BACTERIOSES - Poursuivez la protection des vergers exposés

- sur abricotier et pêcher, 3 traitements ont déjà dû être réalisés intervalle 10-12 jours maxi entre 2 traitements
- sur cerisier, 2 traitements ont déjà dû être réalisés intervalle 15 jours maxi entre 2 traitements

FUSICOCCUM - Poursuite de la protection des pêchers atteints

Les risques de reprise de la maladie dans les vergers touchés sont importants après un automne pluvieux.
Les B.M.C. pourraient aussi être intéressants à la chute des feuilles contre les attaques de CYTOSPORA sur les jeunes rameaux.
Pour les 2 maladies, soulignons l'importance primordiale des mesures prophylactiques : éliminer et brûler les rameaux atteints.

CORYNEUM - Une lutte spécifique en l'absence de traitement anti-bactérioses

Ces traitements sont efficaces contre le Coryneum. Dans les vergers atteints de cette maladie et non protégés contre les bactérioses, on interviendra dès réception avec une bouillie dosée à 200 g de cuivre métal par hl. Attention à la sensibilité au cuivre du pêcher : traitez par beau temps sur feuillage sec.

Mesures prophylactiques : indispensable complément de la lutte chimique

- taille tardive des vergers sensibles : pas de taille à l'automne
- désinfection des outils de taille entre chaque arbre à l'alcool à brûler
- protection immédiate des grosses plaies de taille avec un badigeon antiseptique

Ces précautions sont essentielles vis-à-vis des maladies bactériennes.

P.1326

Imprimerie de la Région RHÔNE ALPES Directeur Gérant J.C. BAUDRIN Commission Paritaire de Presse N° 1656 AD

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURES - Après la récolte, limitez l'inoculum des vergers les plus atteints
Ce traitement ne se justifie que dans les vergers ayant subi des attaques importantes de tavelure.

Intervenez entre le début et la moitié de la chute des feuilles (dès réception dans bien des cas) en pulvérisation foliaire avec de l'urée (PERLUREE à 120 kg/ha).

Le traitement agit en accélérant la décomposition des feuilles, ce qui empêche la formation des périthèces, forme hivernante des tavelures. Les 60 unités d'azote ainsi apportées doivent être prises en compte dans la fertilisation azotée globale.

Précautions :
- ne pas mélanger avec un autre produit.
- pour solubiliser l'urée, utiliser de préférence de l'eau à 20°.
- pour rincer les appareils après le traitement pour éviter la corrosion.

CHANCRE A NECTRIA - En verger atteint, traitez au cuivre
2 à 3 interventions dosées à 500 g de cuivre métal par hl pendant la chute des feuilles ; la 1ère dès réception.

Lors de la taille, éliminez et brûlez tous les rameaux atteints.
Curetez les chancres jusqu'au tissu sain, puis badigeonnez avec une peinture antiseptique.

PSYLLES DU POIRIER - En verger infesté, intervenez entre le 7 et le 10 Novembre
Le traitement d'automne n'est à envisager que dans les quelques vergers où des populations de psylles importantes se sont développées en fin de saison. Il ne remplace, en aucun cas, le traitement d'hiver.
Comme ce dernier, il vise les adultes.

Produits utilisables : les pyréthrinoïdes homologuées à la dose du fabricant.

Le bandeau annonce suivant concernera le Bas-Vivarais qu'à partir de 1989.